

# SPIDER FIGHTER

Insecticida desarrollado para acaros



## DOSIS GENERALES

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Árboles frutales	7 cc/L de agua	Aplicación con aspersora cada 10 días.
Hortalizas	2 - 3 L /200 de agua	Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo.
Papa	7 cc/L de agua	Aplicación con aspersora cada 10 días.

día, evite utilizarla de un día para otro. **Spider Fighter** puede aplicarse con equipo convencional terrestre (mochila o tractor). Para un buen control, asegúrese de cubrir perfectamente el follaje y los frutos (si están presentes y se encuentran infestados). Puede repetir la aplicación a intervalo de 7 días o como mejor convenga para mantener el control. Use la dosis alta en infestaciones masivas y de preferencia durante la época de crecimiento o cuando las plantas sean grandes y densas.

### INCOMPATIBILIDAD:

Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas (surfactantes, coadyuvantes, adherentes u otros aditivos), deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos que cuenten con registro sanitario vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta.

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

**Spider Fighter** se debe manejar con las consideraciones propias para los productos químicos. Manténgase en un lugar fresco y ventilado. Disponga de los empaques en un lugar bajo llave. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas. Almacéñese y transpórtese en su envase original y debidamente etiquetado.

El personal deberá utilizar goggles, guantes, ropa y zapatos de seguridad, evitando comer, beber y/o fumar durante el manejo del producto.

- No ingerir ni dejar al alcance de los niños.

- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y forrajes.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua y acuda inmediatamente a un médico.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Agitar el envase antes de su uso.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Apariencia:** Líquido Amarillo

**Densidad:** 0.95 -1.05 g/mL

**PH neto:** n / d

**Punto de ebullición:** 153.6–158.9 +1°C

**Punto de inflamación:** > de 72° C

**Solubilidad:** en agua <1g/L

**Olor:** Olor a solvente

### Presentaciones: 1L

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**  
Beta-Abamectina  
Solventes y emulsificante

**% EN PESO**  
1.8 %  
98.2 %


### INSTRUCCIONES DE USO:

**Spider Fighter** es un insecticida / acaricida agrícola formulado como concentrado emulsionable, que puede ser aplicado con cualquier tipo de aspersora y la cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo de aplicación utilizado.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje del cultivo a proteger. Vierta agua limpia en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **Spider Fighter** y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante agitación mientras se aplica. La mezcla debe ser aplicada el mismo

### PELIGROSIDAD



EQUIPO DE SEGURIDAD Y RIESGOS ESPECIALES

